

疾病摘要

胆囊腺肌瘤病

Adenomyomatose der Gallenblase

同义词	腺样增生性胆囊炎 囊状胆囊炎 壁内憩室病
首次报道	1960年 Jutras 报道为“增生性胆囊病”的一种形式 (= 非炎性或非肿瘤性胆囊壁疾病)
病因学	胆囊腔内压增高? (类似于结肠憩室病)
发生率	3%~5% (口服造影剂胆囊造影术) 常伴发结石
年龄	40~50岁 (未见于儿童)
性别分布	性别无明显差异
临床表现	大多数无症状 右上腹部隐痛 有时绞痛
病理特征	粘膜增生 肌层增厚 罗阿氏窦(憩室)扩大
3种形式:	* 广泛性(弥散性) * 节段性(环状性) * 局限性(通常位于胆囊底部:腺肌瘤)




图1 胆囊粘膜和肌层增厚伴罗-阿氏窦扩大。



图2 ERC:胆囊漏斗部憩室内念珠状造影剂集积。



图3 超声图:增厚的胆囊壁伴罗-阿氏窦囊性扩大。




图4 CT:节段性壁增厚伴腔狭窄。

X线征象

超声诊断学

1. 局限或广泛性壁增厚
2. 增厚的壁内小囊性区
3. 增厚的壁内强回声包含物
4. 胆囊收缩不变或升高

口服胆囊造影术

广泛型:念珠状胆囊(在扩大的罗-阿氏窦内有玫瑰结形环状圆形造影剂聚集)

节段型:沙表状胆囊

局限型:胆囊底部有息肉状充盈缺损

鉴别诊断

慢性胆囊炎,胆囊肿瘤

同济医科大学附属同济医院

汪玲译

赵华月校

Röntgenpraxis, 1996, 49:14-15

(1996-06-20 收稿)