腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿的影像诊断

陈绍红, 王敏, 张青梅

【摘要】 目的:探讨腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的诊断方法。**方法:**搜集 7 例腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的全部诊治资料,进行回顾性分析和总结。**结果:**7 例患者中 5 例常规 X 线结肠气钡双重造影发现穿孔伴脓肿形成。7 例 B 超,4 例 MRI 和 CT 均显示右下腹肿块影。7 例均手术治疗,6 例术后良好,1 例术后腹膜炎。**结论:**腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的诊断,以结肠 X 线气钡双重造影检查最准确,MRI 和 CT 可作为补充诊断手段。

【关键词】 慢性阑尾炎;穿孔;脓肿;结肠气钡双重造影

【中图分类号】 Rf574. 61; R445. 1 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1000-0313(2007)01-0061-02

Imaging Diagnosis of Chronic Suppurative Appendicitis with Perforation within Retroperitoneum CHEN Shao-hong, WANG Ming, ZHANG Qin-mei. Department of Radiology, Tongji Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430030, P. R. China

【Abstract】 Objective: To investigate the diagnosis of chronic suppurative appendicitis with perforation, in order to improve its diagnostic accuracy and treatment effect. **Methods:** The clinical materials of 7 cases with chronic suppurative appendicitis with perforation within retroperitoneum were analyzed retrospectively. **Results:** Of these 7 cases, perforation and abscess formation were discovered by double contrast barium enema in 5 cases. Mass located in right lower quadrant was revealed by ultrasonography in 7 cases, by MRI and CT in 4 cases. All of the 7 cases had surgical treatment, 6 cases were fine but 1 cases had peritonitis after operation. **Conclusion:** Double contrast barium enema is the most accurate imaging technique for the diagnosis of chronic suppurative appendicitis with perforation within retroperitoneum, MRI and/or CT are complementary diagnostic modalities.

【Key words】 Chronic appendicitis; Perforation; Abscess; Double contrast barium-enema

笔者搜集和总结了近 2 年来,本院经结肠气钡双重造影检查发现,并经手术、病理证实的 7 例腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的病例资料,以便加深对异位阑尾炎的认识和及早治疗。

材料与方 法

7 例腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的患者,男 5 例,女 2 例;年龄 12 岁~54 岁,平均 31 岁。病程 3~18 个月,平均 9 个月。手术前白细胞高于正常者 6 例;体温 $>37.5^{\circ}\text{C}$ 6 例;右下腹可触及包块 4 例;麦氏点压痛 5 例,反跳痛 1 例,腰大肌征阳性 3 例,闭孔肌征阳性 3 例,伴泌尿系症状 2 例,疑妇科病变 1 例。7 例均行腹部 B 超和结肠气钡双重造影检查,其中 4 例加行腹部 MRI 或 CT 扫描。

结 果

7 例腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的患者,B 超均显示有右下腹腹膜后非均质包块,4 例 MRI 或

CT 扫描的患者,亦显示有右下腹肿块性病变(图 1a、b);7 例结肠气钡双重造影检查中,5 例显示腹膜后阑尾穿孔,钡剂经穿孔的阑尾外溢至阑尾周边,呈不规则分布(图 1c、2)。2 例未见阑尾显影,根据盲肠、升结肠改变,间接诊断异位阑尾炎穿孔伴脓肿形成可能。7 例手术和病理证实为腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成。

6 例愈后良好,无明显并发症。1 例术后出现腹膜炎,伴回肠粘连性不全梗阻。经保守治疗而痊愈。

讨 论

阑尾炎是一个常见病,以急性阑尾炎多见。慢性阑尾炎少见,且腹膜后慢性阑尾炎就更少见。据报道,腹膜后阑尾炎在阑尾炎患者中约占 5%^[1]。腹膜后阑尾由于缺乏浆膜,故并发炎症时易穿孔。因位置深,阑尾固定于腹后壁上,这无疑给阑尾炎的诊断增加了困难^[2]。尤其是慢性阑尾炎,症状常不典型,有反复,体征常不明显。因此,仅靠以往的临床症状和体征,以及实验室的化验结果,对腹膜后慢性阑尾炎往往难以确诊。B 超在阑尾炎的诊断中有一定价值^[3],但对腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成其价值有限。本组 7 例

作者单位:430030 武汉,华中科技大学同济医学院附属同济医院放射科

作者简介:陈绍红(1953-),男,湖北人,副主任医师,主要从事腹部影像学的诊断和介入治疗工作。

B超均发现有腹膜后非均质性混合包块,但因阑尾异位,失去正常阑尾形态,而与腹膜后其它肿块难以鉴别。

MRI和CT均能发现右下腹包块,但因肠管、肠管内容物,以及异位阑尾诸因素而难以确认(图1a、b)。

而气钡双重结肠钡灌肠检查,直接显示阑尾,见炎性病变的阑尾管壁不规则,管腔粗细不均,密度不均,钡剂从阑尾腔内溢出腔外脓肿内。由于炎性脓肿性病变的周边蔓延或累及周边组织,见阑尾周边的肠管均有相应的改变,如肠管壁不规则,轮廓受压、缺损状,黏膜集中,聚拢。本组7例腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿形成的患者,结肠气钡双重造影检查,其中5例出现以上征象,得出了准确而肯定的诊断(图1c、2)。另外2例是阑尾未见显影;而根据周边回盲部肠管的改变,作出了阑尾炎伴周围脓肿形成的可能诊断,阑尾不显影的原因多为炎性病变更使阑尾腔粘连,闭塞所致。

在诊断慢性阑尾炎伴脓肿形成时,应与回盲部肿瘤鉴别;回盲部区肿瘤的表现如下,当钡剂充盈肿瘤区时,肠管腔内出现充盈缺损,气钡双重相时,肿瘤呈软组织肿块影,肿瘤区肠黏膜破坏、消失,病变境界清楚,阑尾显影时,规则、光整,局部压痛不如炎性病变明显,可有大便变形,或大便带血。晚期可有转移征象或肠梗阻征象。

阑尾炎穿孔一般不做钡灌肠,但对诊断和鉴别诊断十分困难的病例,如腹膜后慢性阑尾炎穿孔伴脓肿

图1 右下腹瘤伴肿块性病变5个月,腹部MRI轴面像矢状面像,均示右下腹膜后肿块状影,混杂信号。大小约5 cm×5 cm左右,如箭所示。a) MRI轴面; b) MRI矢状面; c) 钡灌肠系阑尾不规则,尾端向右上方走行(短箭),与回盲部、盲肠、升结肠一起形成开口向右上方的鱼钩状改变,盲肠、升结肠有增粗的黏膜集中(长箭)。图2 腹膜后慢性坏疽性阑尾炎穿孔伴脓肿,钡剂灌肠示腹膜后阑尾穿孔并有拳头大不规则脓腔,并向髂骨和升结肠旁沟蔓延(箭)。

形成的患者,为了排除肿瘤明确诊断,仍可行结肠钡剂灌肠,以便得出确切的诊断,立即给予治疗。

参考文献:

- [1] 郑铁兵. 腹膜外位阑尾炎临床诊治的探讨[J]. 实用外科杂志, 1989,7(9):379.
- [2] 杜国元,柳复生. 腹膜后阑尾炎的治疗策略[J]. 腹部外科, 1998, 11(3):109-110.
- [3] 刘明瑜,何小梅,樊文峰,等. 超声对阑尾病变的诊断价值[J]. 2003,19(7):536-539.

(收稿日期:2006-01-02 修回日期:2006-04-31)