- [3] Yankelevitz DF, Henschke CI. Dose 2-year stability implies that pulmonary nodules are benign? [J]. AJR, 1997, 168(2): 325-328.
- [4] 李慎江, 肖湘生, 刘士远, 等. 孤立性肺腺癌血流模式定量 CT 参数相互关系的初步研究[J]. 放射学实践, 2003, 18(4): 283-285.
- [5] 白荣杰, 程晓光, 申宝忠, 等. 64 层 CT 灌注成像对孤立性肺结节微血管结构的评价[J]. 临床放射学杂志, 2008, 27(8): 1032-1037.
- [6] 伍建林, 李光军, 王克礼, 等. 多层螺旋 CT 灌注成像鉴别诊断肺癌与肺良性肿瘤[J]. 中国医学影像技术, 2005, 21(4): 551-555.
- [7] 朱才松, 杨军, 吕奇, 等. 多层螺旋 CT 灌注成像在孤立性肺结节鉴别诊断中的应用[J]. 上海医学影像, 2009, 18(3): 204-208.
- [8] 丁毅, 张镭, 钱晓军, 等. 64 层螺旋 CT 灌注成像在孤立性肺结节鉴别诊断中的应用[J]. 中国医学影像技术, 2007, 23(2): 214-218.
- [9] 王恩峰, 陈文军, 程明, 等. 螺旋 CT 灌注成像对孤立性肺结节的诊断意义[J]. 哈尔滨医科大学学报, 2007, 41(1): 57-59.
- [10] 韩铭钧, 冯敢生, 杨建勇, 等. 肺动脉不参与肺癌供血: 试验和

- DSA 研究[J]. 中华放射学杂志, 2000, 34(9): 802-804.
- [11] Swensen SJ, Viggiano RW, Midthun DE, et al. Lung nodule enhancement at CT: multicenter study [J]. Radiology, 2000, 214(1): 73-80.
- [12] Yi CA, Lee KS, Kim EA, et al. Solitary pulmonary nodules: dynamic enhanced multi-detector row CT study and comparison with vascular endothelial growth factor and microvessel density [J]. Radiology, 2004, 233(1): 191-199.
- [13] 徐健, 宋伟, 金征宇, 等. 64 层螺旋 CT 灌注成像多参数联合评价孤立性肺结节[J]. 中国医科学院学报, 2007, 29(6): 750-754.
- [14] Yeon JJ, Kyung SL, Sun YJ, et al. Solitary pulmonary nodule: characterization with combined wash-in and washout features at dynamic multi-detector row CT [J]. Radiology, 2005, 237(3): 675-683.

(收稿日期: 2010-08-20)

· 病例报道 ·

MSCTA 诊断 Dieulafoy 病一例

裴宇

【中图分类号】R814.42; R573.2 【文献标识码】D 【文章编号】1000-0313(2011)03-0294-01

病例资料 患者,男,41岁。间断呕血及柏油样便5年,伴头晕乏力。查体无明显异常。B超示脾大。胃镜检查示胃后壁胃底胃体交界处可见大头针帽大小血痂,行腹部 MSCTA 检查,示胃底后壁内有扭曲增粗的血管影,其末梢血管增多呈丛状,强化程度与腹腔动脉一致,行多方位 MIP、MPR 及 VR 观察,示血管直接起源于腹腔干开口水平腹主动脉左侧壁,未见异常侧支及静脉显影(图1~3),CT 诊断为胃底后壁动脉血管畸形,结合临床诊断为 Dieulafoy 病。患者行胃大部切除术,术中于距贲门约5cm处的胃后壁近大弯侧粘膜下可见曲张的动脉血管团。术后病理标本送检示胃壁粘膜下有迂曲扩张的动脉血管并出血,符合 Dieulafoy 病改变。

讨论 Dieulafoy 病是上消化道严重出血的少见原因之一,其基本病理特征为胃黏膜下增粗并走行异常的畸形小动脉破裂出血,又名胃黏膜下恒径动脉破裂出血,多发生在距贲门6cm以内的胃壁,也可发生于消化道的其它部位。黏膜下的异常小动脉直径可达1~4mm,粗于胃壁内逐渐变细的正常小动脉(直径仅0.1~0.2mm),具有正常的血管结构,无动静脉畸形和动脉瘤的表现,血管表面的黏膜呈糜烂、浅溃疡改变,多在血压增高、饮酒、药物、粗糙食物及应激等因素的诱发下,黏膜下动脉发生破裂出血,在血栓和凝血块的作用下出血可自行停止^[1]。

Dieulafoy 病以间歇性反复性呕血或/和柏油样便为主要症状,以往诊断主要依靠内镜、选择性腹腔动脉造影、超声内镜和剖腹探查。内镜检查为 Dieulafoy 病的首选检查方法^[2]。经检索国内文献尚未见行 MSCTA 检查诊断 Dieulafoy 病的报道,随着 CT 技术的发展,MSCTA 对于腹腔血管性病变的诊断价值

图1 上腹部 CT 示近胃底部胃后壁内有扭曲增粗的血管影(箭),与腹主动脉强化程度一致。图2 MIP 图像显示胃底部扭曲增粗的血管(箭)。图3 VR 图像显示迂曲增粗的畸形血管全貌(箭),并显示其起源于腹腔干开口水平腹主动脉左侧壁。

已得到公认,大部分的血管狭窄、堵塞及其它形态和走行的异常等 MSCTA 均能清晰显示,并采用 MIP、CPR 和 VR 等多种后处理技术,可准确显示病变血管的空间位置和解剖关系。MSCTA 可作为 Dieulafoy 病的备选检查方法,对诊断和指导手术治疗具有一定意义。

参考文献:

- [1] 费贵军, 陆星华. Dieulafoy 病在中国的诊治现状-国内文献分析 [J]. 胃肠病学, 2004, 9(4): 230-232.
- [2] 蒋楠, 蔡建庭. Dieulafoy 病诊疗现状 [J]. 浙江医学, 2007, 29(3): 296-298.

(收稿日期: 2010-09-29)

作者单位: 434200 湖北, 松滋市人民医院 CT 室

作者简介: 裴宇(1979—), 男, 湖北松滋人, 主治医师, 主要从事 CT 及 MRI 诊断工作。