子宫内膜癌体素内不相干运动与动态增强参数相关性研究

林澄昱, 何泳蓝, 戚亚菲, 王小奇, 周海龙, 李源, 孙昊, 向阳, 金征宇, 薛华丹

【摘要】 目的:探索子宫内膜癌病灶体素内不相干运动 IVIM 定量参数与动态增强 DCE-MRI 定量参数的相关性。**方法:**2017 年 11 月—2018 年 12 月,前瞻纳入 36 例活检病理证实的子宫内膜癌患者行子宫 IVIM 及 DCE 扫描。两名放射科医生独立测量病灶最大层面的 D、 D^* 、f、TTP、wash-in、wash-out、Ktrans 和 Kep。计算观察者间组内相关系数评估测量一致性。应用 Pearson 和 Spearman 相关性分析评估各项参数的相关性。**结果:**观察者间测量一致性良好 ($ICC > 0.8$)。D 与 Kep 中度正相关, Pearson $r = 0.410, p = 0.013$; f 与 wash-in 弱正相关, Pearson $r = 0.375, p = 0.024$; f 与 wash-out 中度正相关, Pearson $r = 0.483, p = 0.003$; f 与 TTP 弱负相关, Spearman $r = -0.326, p = 0.049$; $f \times D^*$ 与 wash-out 中度正相关, Spearman $r = 0.434, p = 0.013$ 。**结论:**子宫内膜癌病灶 IVIM 参数与 DCE 各参数间存在相关性, IVIM MR 有望不依赖对比剂增强评价病灶血供特征。

【关键词】 子宫内膜肿瘤; 体素内不相干运动; 动态增强磁共振成像增强

【中图分类号】 R445.2; R737.33 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1000-0313(2019)10-1088-04

DOI:10.13609/j.cnki.1000-0313.2019.10.007

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

Correlation of parameters of intravoxel motion incoherent and dynamic contrast-enhanced MR imaging in lesion of endometrial cancer

LIN Cheng-Yu, HE Yong-Lan, QI Ya-Fei, et al. Department of Radiology, Peking Union Medical College Hospital, Peking Union Medical College and Chinese Academy of Medical Sciences, Beijing 100730, China

【Abstract】 Objective: To investigate the correlation between parameters of intravoxel incoherent motion (IVIM) and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging (DCE-MRI) in patients with endometrial cancer. **Methods:** Between November 2017 and December 2018, 36 patients pathologically confirmed of endometrial cancer were included in this prospective study. Pelvic examinations were performed in a 3.0T MR scanner. IVIM parameters (D, D^* , and f) and DCE-MRI parameters (time to peak, wash-in, wash-out, Ktrans, and Kep) were blindly measured by two radiologists. The inter-observer inter-class correlation coefficient was calculated. Pearson and Spearman's correlation was performed to evaluate the correlation among these parameters. **Results:** Excellent agreement was found between two observers ($ICC > 0.8$). Moderate to mild correlations was found between D and Kep (Pearson $r = 0.410, P = 0.013$), f and wash-in (Pearson $r = 0.375, P = 0.024$), f and wash-out (Pearson $r = 0.483, P = 0.003$), f and TTP (Spearman $r = -0.326, P = 0.049$) and $f \times D^*$ and wash-out (Spearman $r = 0.434, P = 0.013$). **Conclusion:** IVIM perfusion-related parameters demonstrated a moderate-to-mild correlation with DCE-MRI quantitative parameters in endometrial cancer and have the potential to evaluate the blood supply of the lesion.

【Key words】 Endometrial neoplasms; Intravoxel incoherent motion; Dynamic contrast-enhanced MR imaging

子宫内膜癌(endometrial cancer, EC)起源于子宫

作者单位:100730 北京,北京协和医院放射科(林澄昱,何泳蓝,戚亚菲,周海龙,孙昊,金征宇,薛华丹);北京协和医院妇产科(李源,向阳);200070 飞利浦(中国)投资有限公司(王小奇)

作者简介:林澄昱(1992—),男,浙江宁波人,博士后,住院医师,主要从事女性生殖系统影像研究工作。

通讯作者:薛华丹, E-mail: bjdanna95@hotmail.com

基金项目:北京自然科学基金青年项目(7184234)

内膜,好发于围绝经期女性,是女性生殖系统最常见的恶性肿瘤之一^[1]。盆腔 MR 检查得益于其良好的软组织分辨力,是目前各国或地区 EC 诊治指南中广泛推荐术前评估方法^[2,3]。其中,动态增强扫描(dynamic contrast-enhanced, DCE)可以有效提升病灶检出的效率,EC 在 DCE 早期一过性增强,随后呈低强化

区。近来一些研究发现 DCE 的衍生参数如容积转移常数 K_{trans} 、速率常数 K_{ep} 、达峰时间(time to peak, TTP)、上升斜率(wash-in)及下降斜率(wash-out)与肿瘤分化级别、临床分期、治疗反应、复发等预后因素密切相关,可以反应肿瘤的微灌注环境和生物学特性^[4-9]。然而,DCE 需要高压注射钆对比剂,对患者血管条件要求高,存在对比剂渗漏、过敏、肾损伤等风险,在临床使用中存在一定局限性。体素内不相干运动(intravoxel incoherent motion, IVIM)DWI 基于多 b 值双指数模型,可以无创评估组织内因毛细血管微灌注产生的伪扩散系数 D^* 及灌注系数 f ,并将这一效应从传统单指数模型 DWI 所得表观扩散系数 ADC 中加以区分,得到单纯水分子扩散系数 $D^{[10]}$ 。本研究通过前瞻队列研究,探究 IVIM 微灌注相关参数是否与 DCE 灌注及通透性相关参数存在相关性。

材料与方法

1. 研究对象

本研究经医院伦理委员会批准,所有参与者均签署知情同意书。2017年11月—2018年12月前瞻性纳入 EC 患者行盆腔 MR 检查,纳入标准:①经活检病理证实为 EC;②尚未行任何治疗;③无 MR 检查禁忌;共纳入 53 例,年龄 23~78 岁,中位年龄 42 岁;其中 9 例因血管条件不佳未行 DCE 扫描,8 人例因病灶过小(矢状面最大径 $<1\text{cm}$)无法可靠测量出组,共纳入 36 例。

2. 检查方法

采用飞利浦 Ingenia CX 3.0T 磁共振成像系统进行盆腔 MR 扫描。检查前 30 min 使用 10 mL 开塞露灌肠以减少乙状结肠及直肠内的气体,扫描前排空膀胱。常规扫描序列包括轴面及矢状面 $T_2\text{WI}$ 和轴面 $T_1\text{WI}$;矢状面 IVIM-DWI 采集 8 个 b 值,分别为 0, 10、20、50、100、200、400、800 s/mm^2 , TR 3000 ms, TE 75 ms, 视野 180 mm $\times$ 144 mm, 无层间距,体素 2.5 mm $\times$ 1.14 mm $\times$ 3 mm,16 层扫描时间共计 3 分 32 秒;矢状面 DCE 通过 GRE 采集不压脂图像,TR 4.0 ms,TE 2.0 ms,增强前于 5°、15°两个翻转角进行两次扫描,经肘静脉高压注射器团注注入 Gd-DTPA 对比剂,随后追加 20 mL 生理盐水冲管,注射开始时同步于 8°翻转角连续扫描,视野 280 mm $\times$ 280 mm,无层间距,体素 1.3 mm $\times$ 1.5 mm $\times$ 3 mm,时间分辨率 6s,信号平均次数为 1,21 层扫描时间共 5 分 51 秒。对比剂剂量 0.2 mmol/kg,注射流率 2.0 mL/s。

3. 图像分析

将原始数据导入飞利浦图像工作站(Intellispace Portal,版本号 10.1.0.64190)进行后处理;通过 MR

Advanced Diffusion Analysis 软件包得到 EC 的 IVIM 参数分布图,双指数模型计算基于公式 $S_b/S_0 = f \times \exp(-b \times D^*) + (1-f) \times \exp(-b \times D)$;通过 T_1 perfusion 软件包得到 TTP, wash-in 和 wash-out 参数分布图;通过 T_1 permeability 软件包得到 K_{trans} 和 K_{ep} 参数分布图。两名女性生殖系统影像诊断方面经验丰富的放射科医生相互独立,分别于 IVIM $b=800$ 和 DCE 最后一期图像中选取 EC 病灶最大层面勾画 ROI,工作站自动根据同层面 D 、 D^* 、 f 、TTP、wash-in、wash-out、 K_{trans} 和 K_{ep} 分布图计算得到相应参数。

4. 统计学分析

使用 SPSS 23 及 Prism 7 数据分析软件。首先对各组数据进行正态分布检验和方差齐性分析。所得 D 、 f 、 K_{ep} 、Wash-in 和 Wash-out 符合正态分布, D^* 、TTP 和 K_{trans} 不符合正态分布。对于两位测量者得到的各项参数,通过双向随机、绝对一致性模型计算观察者间组内相关系数(the intraclass correlation coefficient, ICC)评价观察者间测量一致性, $ICC > 0.75$ 认为一致性良好。对于符合正态分布数据之间,通过 Pearson 相关性分析计算相关系数并进行检验;对于设计不符合正态分布的数据,通过 Spearman 相关性分析计算相关系数并进行检验。相关系数 r 0.8~1.0 认为两者极强相关,0.6~0.8 强相关,0.4~0.6 中度相关,0.2~0.4 弱相关,0~0.2 极弱或无相关。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

结果

子宫内膜癌 IVIM 微灌注相关参数及 DCE 灌注、通透性相关参数观察者间测量一致性良好,各参数观察者间 ICC 及 95% 置信区间分别为 D , 0.901 [0.814~0.949]; D^* , 0.995 [0.991~0.998]; f 0.820 [0.676~0.904]; TTP 0.996 [0.992~0.998]; wash-in 0.966 [0.935~0.982]; wash-out 0.907 [0.825~0.951]; K_{trans} 0.992 [0.983~0.996]; K_{ep} 0.986 [0.972~0.993]。IVIM 参数与 DCE 参数相关性分析方面, D 与 K_{ep} 中度正相关, Pearson $r = 0.410$, $P = 0.013$ (图 1a); f 与 wash-in 弱正相关, Pearson $r = 0.375$, $P = 0.024$ (图 1b); f 与 wash-out 中度正相关, Pearson $r = 0.483$, $P = 0.003$ (图 1c); f 与 TTP 弱负相关, Spearman $r = -0.326$, $P = 0.049$ (图 1d); $f \times D^*$ 与 wash-out 中度正相关, Spearman $r = 0.434$, $P = 0.013$ (图 1e)。

讨论

IVIM 模型的建立基于人体组织内水分子扩散运

图1 a) D 与 Kep 呈中度正相关; b) f 与 wash-in 呈弱正相关; c) f 与 wash-out 呈中度正相关; d) f 与 TTP 呈弱负相关; e) $f \times D^*$ 与 wash-out 呈中度正相关。

动不符合理想正态分布模型这一事实,双指数模型在单指数 DWI-ADC 的基础上引入了毛细血管微灌注效应,将 DWI 中的信号变化分为微灌注引起的快“伪扩散”和单纯水分子运动的慢“真扩散”^[10]。DCE 定量及半定量参数反应了静脉注射顺磁性对比剂后,病灶组织的 T1 弛豫时间动态变化特征。本研究联合运用 IVIM 和 DCE 技术,发现两者不同参数间存在弱-中度相关性。

DCE-MRI 灌注模型中 wash-in 和 wash-out 作为半定量参数,主要用于描述信号曲线上升和下降的斜率^[11];在 IVIM 模型中,参数 D^* 反应了由毛细血管微灌注带来的伪扩散效应,而 f 则用于评价这一效应在整体扩散中的比例;病灶 f 越高,反应了毛细血管微灌注效应越强,从而对比剂进入病灶和洗脱的速率越高,达峰时间越早,这一特征与病灶信号曲线变化斜率增大、达峰时间提前相一致。 Kep 作为 DCE 通透性定量分析参数,反应了单位时间内对比剂回流至微血管的量^[12],这一行为不依赖毛细血管微灌注效应,而与组织的水分子运动通透性相关, D 在 IVIM 模型中作为剔除了微灌注效应的单纯水分子扩散系数,其数值越高,表示单位时间内水分子扩散运动速度越快,这一行为可以解释与 Kep 的正相关性;在既往采用 DCE 技术对 EC 的研究中,Fasmer 等^[13]发现 EC 病灶 Kep 值在高危组织学分型组中更低,并与预后不佳相关,同时,EC 病灶 ADC 值越低同样是预后不佳的因素之一,这反应了高危组织学分型病灶中细胞异型性高、排

列不规则,水分子扩散受限这一特征。

子宫内膜癌患者通常由于围绝经期子宫异常出血就诊,诊断主要通过宫腔镜活检或诊断性刮宫,影像学的主要作用并非诊断而在于准确分期、判断预后,指导治疗方案^[14]。现有针对 EC 的 DCE 或 IVIM 研究大多围绕形态学展开,探索其对于肌层浸润、宫颈基质受累、淋巴结转移等预后相关特征的识别能力。DCE 和 IVIM 定量参数作为评价肿瘤生物学特性、局部微血管环境的影像学标记物探究并未得到重视。Zhang 等^[15]对 70 例早期 EC 患者通过多 b 值扩散模型发现,结合 ADC 和 f ,对与鉴别高危及低危组的 AUC 达到 0.912,敏感度及特异度分别为 81.1% 和 87.5%。进一步研究 DCE 和 IVIM 参数与 EC 病灶生物学特性的关系,有望通过 IVIM 无需注射对比剂,无创评估病灶血供特征,避免增强检查可能带来的医疗风险。

本研究存在以下局限性:①本研究有效样本量共 36 例,研究结果有待后期样本量补充的进一步验证;②EC 大多为 I 型,即中高分化的子宫内膜样腺癌,而 II 型即低分化的子宫内膜样腺癌或非子宫内膜样腺癌(如透明细胞癌,浆细胞癌等)相对少见。本研究共纳入 30 例 I 型 EC,仅 6 例 II 型 EC,受限于样本量,未在 I 型和 II 型两组 EC 患者中发现 IVIM 或 DCE 参数具有统计学意义的差异,进一步前瞻收集队列,分析 IVIM 及 DCE 参数在这两组间的差异,是下一步的研究计划。

综上,IVIM 定量参数,尤其灌注系数 f ,与 DCE

模型中 K_{ep} , wash-in, wash-out, TTP 等重要参数存在一定相关性。IVIM MR 有望无需注射对比剂增强, 无创评估病灶血供特征。

参考文献:

- [1] Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, et al. Global cancer statistics 2018; GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries[J]. CA: A Cancer J for Clinicians, 2018, 68(6):394-424.
- [2] Smith RA, Andrews KS, Brooks D, et al. Cancer screening in the United States, 2019: A review of current American Cancer Society guidelines and current issues in cancer screening[J]. CA: A Cancer J for Clinicians, 2019, 69(3):184-210.
- [3] Colombo N, Creutzberg C, Amant F, et al. ESMO-ESGO-ESTRO consensus conference on endometrial cancer: diagnosis, treatment and follow-up[J]. Ann Oncol, 2016, 27(1):16-41.
- [4] Haldorsen IS, Grüner R, Husby JA, et al. Dynamic contrast-enhanced MRI in endometrial carcinoma identifies patients at increased risk of recurrence[J]. Eur Radiology, 2013, 23(10):2916-2925.
- [5] Fujii S, Kido A, Baba T, et al. Subendometrial enhancement and peritumoral enhancement for assessing endometrial cancer on dynamic contrast enhanced MR imaging[J]. Eur J Radiol, 2015, 84(4):581-589.
- [6] Fukunaga T, Fujii S, Inoue C, et al. Accuracy of semiquantitative dynamic contrast-enhanced MRI for differentiating type II from type I endometrial carcinoma[J]. J Magnetic Resonance Imaging, 2015, 41(6):1662-1668.
- [7] Park SB, Moon MH, Sung CK, et al. Dynamic contrast-enhanced MR imaging of endometrial cancer: optimizing the imaging delay for tumour-myometrium contrast [J]. Eur Radiol, 2014, 24(11):2795-2799.
- [8] Hameeduddin A, Sahdev A. Diffusion-weighted imaging and dynamic contrast-enhanced MRI in assessing response and recurrent disease in gynaecological malignancies[J]. Cancer Imaging, 2015, 15(1):3.
- [9] 陈天佑. 子宫内膜癌的 DWI 和 DCE-MRI 研究进展[J]. 放射学实践, 2015, 30(2):183-185.
- [10] Le Bihan D. What can we see with IVIM MRI? [J]. NeuroImage, 2019, 187:56-67.
- [11] Ciolina M, Caruso D, De Santis D, et al. Dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging in locally advanced rectal cancer: role of perfusion parameters in the assessment of response to treatment [J]. La Radiologia medica, 2019, 124(5):331-338.
- [12] 满育平, 马隆佰, 吴春梅, 等. 3.0T 磁共振 ADC 值及 DCE-MRI 定量分析对颈部良恶性淋巴结鉴别诊断[J]. 放射学实践, 2019, 34(7):729-734.
- [13] Fasmer KE, Bjørnerud A, Ytre-Hauge S, et al. Preoperative quantitative dynamic contrast-enhanced MRI and diffusion-weighted imaging predict aggressive disease in endometrial cancer[J]. Acta radiologica (Stockholm, Sweden: 1987), 2018, 59(8):1010-1017.
- [14] Jang JW, Lee LJ. External beam, brachytherapy, or chemotherapy defining adjuvant therapy for early-stage and high- and high-intermediate-risk endometrial cancer[J]. J Clin Oncol, 2019, 37(21):1778-1784.
- [15] Zhang Q, Yu X, Lin M, et al. Multi-b-value diffusion weighted imaging for preoperative evaluation of risk stratification in early-stage endometrial cancer[J]. Eur J Radiol, 2019, 119:108637.

(收稿日期:2019-08-30 修回日期:2019-09-27)